

### Brodifacoum-Flocken

Attraktiver Haferflockenköder zur gezielten Bekämpfung von Ratten und Mäuse in allen Hygienebereichen.

#### Produkt-Highlights auf einen Blick

- **Bewährter, auslegefähiger Haferflocken-Köder**
- **Wirkung gegen widerstandsfähige, resistente Nagerstämme effektiv**
- **Portionierte Abpackung**



#### Wirkstoff(e)

0,05 g/kg Brodifacoum

#### Eigenschaften und Wirkungsweise

Schüttköder, in welcher Form auch immer, gehören zu den Standardprodukten bei der Bekämpfung von Nagern. Hierzu zählen auch **Brodifacoum-Flocken**, die zur Bekämpfung von Wanderratten bestens geeignet ist.

Bei den **Brodifacoum-Flocken** handelt es sich um einen rot gefärbten Schüttköder, der den Wirkstoff Brodifacoum (0,005%) enthält. Das Präparat ist aus hochwertigen Haferflocken hergestellt, die sich insbesondere durch eine hohe Attraktivität bei Wanderratten auszeichnen. Der Köder wird auch von Mäusen gut aufgenommen

Der Wirkstoff Brodifacoum gehört zur bewährten Gruppe der Antikoagulantien (2. Generation). Er ist auch gegen warfarin-resistente Ratten sehr gut wirksam. Die mehrmalige Aufnahme geringer Mengen schädigt die kapillaren Blutgefäße der Nager und hebt die Gerinnungsfähigkeit des Blutes auf, so dass es zu Blutungen kommt. Die Nager verenden dadurch innerhalb weniger Tage, ohne dass Artgenossen dabei gewarnt werden.

Die Nager sterben nach der Aufnahme des Köders einen schmerzlosen Tod in einem Zeitraum von 4 – 10 Tagen.

#### Gebrauchsanleitung

**Brodifacoum-Flocken** haben sich zur Bekämpfung von Hausmäusen und Wanderratten aber auch Hausratten sehr gut bewährt.

**Brodifacoum-Flocken** werden in den befallenen Objekten an den von Nagern bevorzugten Stellen, wie z.B. Schlupfwinkel, Laufwege der Nager, Futterplätze portionsweise ausgebracht. Da die Ratten in ihren Fressgewohnheiten konservativ sind, müssen sie von ihren gewohnten Nahrungsquellen weggelockt werden, indem dort **Brodifacoum-Flocken** ausgelegt werden. Mäuse sind verstreut lebende Fresser, die die neuartige Nahrung erst einmal untersuchen.

Gegen Ratten sollten die Portionen von **Brodifacoum-Flocken** jeweils 150 bis 200 g (im Abstand von 10 m) betragen. Für eine gesicherte Köderausrage hat sich die Verwendung der **frunax® Rattenköder Depots** besonders bewährt.

Liegt ein besonders hoher Befallsdruck vor oder handelt es sich um schwer bekämpfbare Rattenstämme, empfiehlt es sich den Abstand zwischen den Köderstellen auf 5 m zu verkürzen und/oder die Aufwandmenge auf bis zu 250 g zu erhöhen.

Zur Hausmausbekämpfung sind Köderportionen von ca. 50 g in ausreichend großer Anzahl und in geringen Abständen (alle 2 m) voneinander zu empfehlen.

..2/



## Brodifacoum-Flocken

### Fortsetzung von Seite 1

#### Gebrauchsanleitung –Fortsetzung–

Die Verfügbarkeit von Nahrungs- und Futtermittel für die Nager sollte unterbunden werden, um die Köderannahme zu fördern.

Die Köderstellen sind möglichst täglich zu kontrollieren und die aufgenommene Ködermenge ständig zu ergänzen, bis keine Annahme mehr erfolgt.

Nach Abschluss der Bekämpfungssaktion nicht angenommene Köder einsammeln und entsorgen. Haustiere fernhalten. Nicht offen ausbringen.

Falls nach oder bei den Bekämpfungsmaßnahmen tote oder sterbende Ratten und Mäuse gefunden werden, sind diese sofort wegzuräumen um Sekundärvergiftungen vorzubeugen.

#### Anwendungsbereich(e)

**Brodifacoum-Flocken** werden zur Bekämpfung von Hausmäusen, Wanderratten und Hausratten in allen Hygienebereichen in Räumen und im Freiland einschließlich Haus- und Kleingartenbereich außerhalb des Vorratsschutzes eingesetzt.

#### Hinweise zum Schutz des Anwenders und der Umwelt

GefahrenEinstufung: Keine

Die Anwendung von **Brodifacoum-Flocken** darf nur nach Gebrauchsanweisung erfolgen. Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Beim Umgang mit dem Köder nicht essen, trinken oder rauchen. Immer verdeckt ausbringen (z.B. Köderbox), da die offene Auslegung verboten ist. Haustiere fernhalten.

Unter Verschluss und unzugänglich für Kinder aufbewahren. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Mittel und dessen Reste sowie entleerte Behälter und Packungen nicht in Gewässer gelangen lassen.

Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere.

Aufgrund der Anwendung des Mittels werden Bienen nicht gefährdet.

Aufgrund der festgelegten Anwendungen des Mittels werden Regenwurmpopulationen nicht gefährdet.

#### Erste Hilfe

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

**Gegenmittel:** Vitamin K<sub>1</sub> (unter ärztlicher Kontrolle)

..3/



## Brodifacoum-Flocken

Fortsetzung von Seite 2**Lagerung**

**Brodifacoum-Flocken** in der Originalverpackung kühl, trocken, unter Verschluss sowie unzugänglich für Kinder getrennt von Nahrungs- und Futtermittel und von geruchsintensiven Stoffen lagern.

**Weitere Hinweise**

Durch sorgfältige Prüfung ist erwiesen, dass **Brodifacoum-Flocken** bei Einhaltung unserer Gebrauchsanweisung für die empfohlenen Zwecke geeignet sind. Da die Lagerung und Anwendung außerhalb unseres Einflusses liegen und wir nicht alle diesbezüglichen Gegebenheiten voraussehen können, schließen wir jegliche Haftung für eventuelle Schäden aus Lagerung und Anwendung aus. Wir haften für einwandfreie Qualität von **Brodifacoum-Flocken** zum Zeitpunkt der Lieferung, das Lagerungs- und Anwendungsrisiko tragen wir nicht.

**Abfallbeseitigung/Entsorgung**

Leere Verpackungen nicht weiterverwenden. Leere Verpackungen dem Hausmüll zugeben. Produktreste nicht dem Hausmüll begeben, sondern in Originalverpackungen bei den entsorgungspflichtigen Körperschaften anliefern. Weitere Auskünfte erhalten Sie bei der Stadt- und Kreisverwaltung.

**Zulassung gemäß Biozid-Meldeverordnung**

baua: Reg.-Nr. N-12271

Listung gem. § 18 IfSG beantragt.

**Lieferverpackungen**

0680-050	1 x 10 kg Eimer	Palette: 40 VE
0680-060	1 x 25 kg Sack	Palette: 30 VE

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

